

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 флакон містить настойки листя м'яти перцевої (1 : 20) 25 мл;

*допоміжна речовина:* етанол 70 %.

**Лікарська форма.** Настойка.

Прозора рідина зеленого кольору із запахом та смаком м'яти перцевої.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ «Ліки Кіровоградщини».

Україна, 25014, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Районна, 1.

**Фармакотерапевтична група.**

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТС А04А D20\*\*.

Олія м'яти перцевої (містить до 70 % ментолу та його ефірів) та інші біологічно активні речовини, що містяться в листі м'яти перцевої (кетон-ментон, олеанолева та урсолова кислоти, флавоноїдні глікозиди), стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлекторним шляхом зменшують відчуття нудоти і запобігають блюванню, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

**Показання для застосування.**

Нудота, блювання, розлади травлення, стенокардія, невралгічний біль.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма, спазмофілія. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Відсутні.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Препарат не застосовують у період вагітності і годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Оскільки до складу препарату входить етанол, він може впливати на здатність керувати транспортними засобами та працювати з потенційно небезпечними механізмами.

**Діти.**

Ефективність і безпека застосування препарату дітям до 12 років не встановлені. Тому не рекомендується його застосовувати цій віковій категорії пацієнтів.

**Спосіб застосування та дози.**

Призначають внутрішньо до їди. Дорослим призначають по 10 - 15 крапель настойки 3 - 4 рази на добу. Дітям старше 12 років призначають із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

**Передозування.**

Повідомлення відсутні.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції (почервоніння шкіри, висипи, свербіж).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не відома.

**Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі від 8 до 15 °С в захищеному від світла місці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.