

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СУМШІ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ

Склад лікарського засобу.

Діючі речовини: 1 мл розчину містить ментолу – 0,0071 г, настоянки евкалипта (1:5) – 0,357 мл,
допоміжна речовина: етанол 96 %.

гліцерину (85 %) – 0,357 г;

Лікарська форма.

Розчин.
Прозора рідина жовто-бурого кольору із запахом ментолу та евкалипта.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ “Фітофарм”.
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Код АТС R05C A10.
Препарат належить до засобів, які чинять комплексну відхаркувальну, антисептичну та протизапальну дію. Ментол має здатність подразнювати рецептори слизової оболонки та посилювати місцевий кровообіг. Евкалипта настоянка чинить муколітичну, відхаркувальну, протимікробну та протизапальну дію. Гліцерин розріджує запальні ексудати. Спирт етиловий є антисептичною та дезодоруючою речовиною, посилює ефекти інших компонентів.

Показання для застосування.

гострих респіраторних захворюваннях різної етіології.

Місцеве лікування у складі комплексної терапії

Протипоказання.

препарату, дитячий вік до 3 років.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може завдати шкоди Вашому здоров'ю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату в період вагітності та годування груддю можливе лише після оцінки лікарем співвідношення ризик/користь.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат може впливати на швидкість реакції, тому при його застосуванні слід утримуватися від керування автотранспортом і здійснення потенційно небезпечних видів діяльності.

Діти. Не застосовувати дітям віком молодше 3 років.

Спосіб застосування та дози.

скляниці теплої води і використовують у вигляді інгаляцій. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від досягнутого ефекту, характеру комплексної терапії та переносимості препарату.

0,5 чайної ложки препарату розчиняють у

Передозування.

(подразнення шкіри в ділянці губ та носа).

При тривалому застосуванні можливі прояви місцевої реакції

Побічні ефекти.

В окремих випадках при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливі прояви місцевої алергічної реакції (почервоніння та висипання на шкірі в ділянці губ та носа); бронхоспазм.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія невідома.

Термін придатності.

3 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі від 8 °С до 15 °С.

Упаковка.

По 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.