

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ВАЗЕЛІНОВЕ МАСЛО**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* масло вазелінове;  
1 флакон містить 25 мл масла вазелінового.

**Лікарська форма.** Масло для перорального застосування.

Безбарвна, масляниста нефлюоресуюча в денному світлі рідина без запаху.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ВАТ «Фітофарм».  
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

**Фармакотерапевтична група.**

Проносні засоби. Код АТС А06А А01.

Вазелін – очищена суміш твердих та рідких вуглеводнів, які одержують із нафти. При прийомі внутрішньо, не всмоктуючись, розм'якшує калові маси та сприяє їхньому просуванню кишечником.

**Показання для застосування.**

Хронічні запори у дорослих.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату. Не можна застосовувати внутрішньо при гострих запальних процесах органів черевної порожнини (апендицит, перитоніт, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразковий коліт), геморої, у періоди вагітності та менструації, а також дітям. Не застосовувати при отруєнні фосфором і фосфорорганічними сполуками. Не застосовувати внутрішньо одночасно з жиророзчинними антигельмінтними засобами (натамол, вермокс, медамін, авермол).

**Особливі застереження.**

Перед застосуванням збовтують.

Після припинення курсу застосування внутрішньо масло вазелінове може певний час виділятися із заднього проходу та забруднювати білизну, тому рекомендується використовувати прокладки.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності протипоказаний.

У період годування груддю застосовують з урахуванням співвідношення користь для матері/ ризик для дитини, яке визначає лікар.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Дані відсутні.

**Діти.**

Не застосовується у дітей.

**Спосіб застосування та дози.**

Призначають дорослим внутрішньо по 1-2 столові ложки 1 раз на добу. Тривалість застосування визначає лікар залежно від терапевтичного ефекту та переносимості препарату.

**Передозування.**

Не описане. Можливе посилення побічних ефектів.

**Побічні ефекти.**

Тривале застосування може спричинити порушення процесу травлення, нудоту, анорексію, гіповітаміноз А, D, К, подразнення та свербіж у ділянці заднього проходу. В окремих випадках можливі алергічні реакції (гіперемія, свербіж шкіри).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Посилює побічні ефекти жиророзчинних та антигельмінтних засобів.

**Термін придатності.**

5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.