

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЬЯМИ
(RHIZOMATA ET RADICES INULAE)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: Inula helenium;

основні фізико-хімічні властивості: шматочки коренів та кореневищ різної форми, колір сірувато-бурий, жовтувато-білий або жовтувато-сірий;

склад: оману кореневища з коренями.

Форма випуску. Кореневища з коренями.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A24.

Фармакологічні властивості. Препарати із кореневищ з коренями оману, що містять ефірну олію, до складу якої входять геленін, алантол, проазулен, суміш сесквітерпенових лактонів, а також вітамін Е, сапоніни, смоли, глей, слиз, пігменти, полісахариди та алкалоїди, чинять відхаркувальну, протизапальну та антимікробну дію.

Показання для застосування. Як відхаркувальний засіб при захворюваннях верхніх і нижніх дихальних шляхів.

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку (16 г) сировини кладуть в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і нагрівають у киплячій воді (на водяній бані) 30 хв. Охолоджують при кімнатній температурі протягом 10 хв і проціджують. Залишок віджимають, об'єм одержаного відвару доводять кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовують внутрішньо в теплом вигляді, за 1 год до їди. Дорослі приймають по 1/2 склянки 2-3 рази на добу. Діти старше 12 років – від 1 столової ложки до 1/3 склянки 2-3 рази на добу. Перед застосуванням відвар рекомендується збовтувати.

2 фільтр-пакети вміщують у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Приймають за наведеною вище схемою.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

Побічна дія. Алергічні реакції при підвищеній чутливості до препарату (гіперемія та набряк шкіри, висип).

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату.

Передозування. Не виявлене.

Особливості застосування. Безпека та клінічна ефективність застосування оману кореневищ з коренями у дітей віком до 12 років не встановлені, тому застосовувати препарат дітям цієї вікової групи можна тільки після ретельної оцінки співвідношення користь/ризик.

Вагітність і годування груддю. Безпека та ефективність препарату при вагітності та в період годування груддю не вивчалися, тому призначати його слід з урахуванням співвідношення користь для матері / ризик для плода (дитини).

Вплив на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами. Не описаний.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не досліджувалася.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при кімнатній температурі (15 – 25 °С); приготований відвар (настій) – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Термін придатності - 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г у пакетах, пачках; по 4 г у фільтр-пакетах, по 12 фільтр-пакетів у пачці.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

Адреса. Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.