

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГРИП-ХЕЕЛЬ
(GRIPP-HEEL)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглі, плоскі з фаскою, від білого до біло-жовтого кольору, можливі жовті та темні вкраплення, без запаху;

склад: 1 таблетка містить: Aconitum napellus D4 – 120 мг, Bryonia D4 – 60 мг, Lachesis mutus D12 – 60 мг, Eupatorium perfoliatum D3 – 30 мг, Phosphorus D5 – 30 мг;

допоміжні речовини: магнію стеарат, лактоза.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Препарат має дезінтоксикаційну, протизапальну, імунокоригуючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Показання для застосування. У комплексному лікуванні та профілактиці грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій; інших інфекційних та гострих запальних захворювань, які супроводжуються інтоксикацією.

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим і дітям від 6 років – 1 таблетка сублінгвально (до повного розсмоктування), дітям до 1 року – 1/4 таблетки, від 1 до 3 років – 1/2 таблетки, від 3 до 6 років – 3/4 таблетки, розтертої на порошок та розчиненої в 1 чайній ложці води.

Приймати 3 рази на добу за 15 – 20 хвилин до їди або через годину після. У разі гострого початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.

Курс лікування – 5 – 10 діб.

Після зникнення симптомів захворювання рекомендується продовжити прийом препарату 2 рази на добу ще протягом 5 – 7 днів з метою профілактики ускладнень.

З профілактичною метою грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в осінньо-зимовий період, приймати разову вікову дозу 1 раз на добу (вранці), в період епідемії грипу – 2 рази на добу (вранці та ввечері).

Побічна дія. Не відома.

Протипоказання. Не відомі.

Передозування. Не відзначалось.

Особливості застосування. Людям з непереносимістю лактози слід враховувати, що препарат у своєму складі містить лактозу. Питання про доцільність застосування препарату вагітними та жінками, що годують груддю, вирішується індивідуально.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Умови та термін зберігання. Контейнер зберігати у зовнішній картонній коробці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Зберігати в місцях, недоступних для дітей!

Термін придатності – 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

Виробник. Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Адреса. Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.