

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА З АМБЕНОМ
(HAEMOSTATIC SPONGE WITH AMBENUM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: Ліофілізована гігроскопічна пориста маса білого з жовтуватим або жовтого з коричневим відтінком кольору з легким специфічним запахом;

склад: 1 пляшка містить нативної плазми з донорської крові людини або сухої плазми – 10 мл, 4-(амінометил)бензойної кислоти (амбен) – 0,05 г, кальцію хлориду гексагідрату – 0,05 г.

Форма випуску. Губка гемостатична.

Фармакотерапевтична група. Гемостатичні засоби для місцевого застосування.

Код АТС В02В С50.

Фармакологічні властивості. Губка гемостатична з амбеном належить до засобів, що впливають на систему згортання крові. При місцевому застосуванні препарат, який містить фібрин і тромбін, активує процеси згортання, зупиняє капілярні і паренхіматозні кровотечі. Амбен має антифібринолітичний ефект, пригнічує фібриноліз шляхом конкурентного гальмування плазміногенактивуючого ферменту та пригнічення утворення плазміну.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Місцеві капілярні і паренхіматозні кровотечі, кровотечі з кісток, м'язів та тканин, кровотечі локалізовані на поверхні тіла або в його порожнинах. Носові, ясенні кровотечі та кровотечі у хворих на тромбоцитопенічну пурпуру, лейкоз, геморагічні тромбоцитопатії, синдром Ослера - Рандю, цироз печінки, хронічний нефрит.

Спосіб застосування та дози. Губку гемостатичну з амбеном застосовують місцево. Перед застосуванням препарат дістають з пляшки стерильним інструментом. Разова доза залежить від характеру і вираженості кровотечі: застосовують від 1/4 частини Губки до 3 – 4 Губок. Після висушування ділянки, що кровоточить, її тампують шматочками Губки гемостатичної з амбеном, притискаючи їх протягом 3–5 хвилин стерильною марлевою кулькою. При виражених кровотечах Губку гемостатичну з амбеном притискають до поверхні, що кровоточить, хірургічним інструментом з плоскою полірованою поверхнею, щоб уникнути втрати частини Губки, як це буває у разі застосування марлевої кульки. Для м'якої, тривалішої тампонади Губка гемостатична з амбеном може бути вміщена у марлевий тампон. Тампони виймають через добу.

Побічна дія. Не виявлена.

Протипоказання. Не встановлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Передозування. Не встановлено.

Особливості застосування. Застосовують місцево. Препарат також застосовують при підвищенні фібринолітичної активності.

Умови та термін зберігання. Зберігають у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25⁰С.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. По 0,8 г препарату в пляшці, упакованій в пачку.

Виробник. ВАТ "Біофарма".

Адреса. м. Київ, вул. М Амосова, 9.