

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ГЛОДУ НАСТОЙКА**  
**(TINCTURA CRATAEGI)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* настойки глоду (1 : 10) 25 мл або 100 мл, або 200 мл;

*допоміжні речовини:* спирт етиловий 70 %.

**Лікарська форма.**

Настойка для внутрішнього застосування.

Прозора рідина жовто-червоного кольору, солодкого смаку.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Обласне комунальне підприємство «Фармація».

49057, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 171.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються в кардіології. Код АТС 01ЕВ04.

Завдяки вмісту тритерпенових кислот (олеїнової, урсолової, кратегової) препарат посилює скорочення серцевого м'яза, кровообіг у коронарних судинах серця і в судинах мозку, підвищує чутливість серця до дії серцевих глікозидів. Завдяки вмісту ацетилхоліну глоду настойка зменшує збудливість міокарда. Препарат чинить незначну антигіпертензивну дію.

Препарат добре всмоктується при пероральному застосуванні. Ефект настає через 0,5 - 1 год.

**Показання для застосування.**

Функціональні розлади серцевої діяльності.

**Протипоказання.**

Індивідуальна підвищена чутливість до препарату. Дитячий вік до 12 років. Вагітність, період годування груддю.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Препарат не рекомендують приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

**Особливі застереження.**

*- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами*

Слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

**Спосіб застосування та дози.**

Глоду настойку приймають внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, уповільнення серцебиття тощо). Дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу. Термін лікування – від 6 тижнів.

**Передозування.**

Можливі сонливість, брадикардія. Виникнення цих явищ потребує відміни препарату і вчасного вжиття заходів екстреної допомоги (промивання шлунка, застосування активованого вугілля тощо) та симптоматичне лікування.

**Побічні ефекти.**

Рідко спостерігається сонливість, значне уповільнення серцевого ритму.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів. Не рекомендується приймати з солями алкалоїдів у зв'язку з можливістю утворення небажаних комплексів.

**Термін придатності.**

4 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С. Допускається випадання осаду в процесі зберігання.

**Упаковка.**

По 25 мл, 100 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.