

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

**ПЕРОКСИГЕЛЬ**

**(PEROXYGEL)**

### Загальна характеристика:

**основні фізико-хімічні властивості:** гель безбарвний або світло-білого кольору, без запаху. Має термозворотні якості: при температурі нижче 20 °С та вище 45 °С має форму рідини, але після нанесення на шкіру (тобто при температурі приблизно 36,6 °С) набуває форму гелю;

**склад:** 100 г препарату містять 10 г 30 % перекисю водню (Hydrogenii peroxidum);

**допоміжні речовини:** динатрій ЕДТА, полоксамер 407, етанол 96 %, ортофосфорна кислота 85 %, вода очищена.

**Форма випуску.** Гель для зовнішнього застосування.

**Фармакотерапевтична група.** Антисептичні й дезінфікуючі засоби.

Код АТС D08A X01.

### Фармакологічні властивості.

*Фармакокінетика.*

Препарат містить як активну речовину перекис водню. У водному середовищі під дією каталази перекис водню розкладається на воду та іонізований кисень. Ця реакція відбувається дуже швидко в присутності крові, гною або некротичних тканин. Кисень, що виділяється, утворює піну та механічно очищує засохлі, гнійні рани, розрихлює струпа. Препарат чинить бактерицидну, відбілюючу, м'яку місцеву припікаючу дію.

**Показання до застосування.** Зовнішньо для профілактики інфікування ран, саден, подряпин.

### Спосіб застосування та дози.

Застосовують зовнішньо. Невелику кількість гелю наносять безпосередньо на рану. Після висихання гелю на поверхні рани утворюється захисна плівка, що виконує роль захисної пов'язки та оберігає рану від повторного зараження.

**Побічна дія.** Препарат може спричинити короткочасне печіння під час обробки рани. Можливі алергічні реакції.

**Протипоказання.** Дитячий вік - до 2-х років. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Не вводити в порожнини та проникаючі рани (можливість емболії).

**Передозування.** Не описане.

**Особливості застосування.** Препарат має термозворотні властивості: при температурі нижче 20 °С та вище 45 °С має форму рідини, але після нанесення на шкіру (тобто при температурі приблизно 36,6 °С) набуває форму гелю.

Не застосовувати на великі рани або на пошкоджені ділянки шкіри, що потребують хірургічного лікування.

*Вагітність і годування груддю.*

Немає даних про негативний вплив препарату на плід через відсутність відповідних досліджень. У період вагітності та годування груддю застосовувати з урахуванням співвідношення ризик/користь.

*Вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати зі складними механізмами.*

Препарат не впливає на психофізичні здібності людини.

Препарат можна застосовувати дітям віком від 2-х років.

### Взаємодія з іншими лікарськими засобами.

Немає даних про взаємодію з іншими лікарськими препаратами при зовнішньому застосуванні.

### Умови та термін зберігання.

Зберігати в закритій тубі при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності - 3 роки, після відкриття туби – 1 рік. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

### Умови відпуску.

Без рецепта.

### Упаковка.

По 15 г гелю в алюмінієвій тубі із захисною мембраною з бушоном із поліетилену в картонній паці.

### Виробник.

Виробниче Фармацевтичне Підприємство «ГЕМІ», Польща.

Pharmaceutical Production Enterprise «GEMİ», Poland.

### Адреса.

вул. Міцкевича 36, 05-480, Карчев, Польща.

Mickevicha str. 36, 05-480, Karchev, Poland.