

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

НОСОЛІН® ПЛЮС

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г препарату містить: оксиметазоліну гідрохлориду 0,50 мг, камфори рацемічної 1,70 мг, левоментолу 1,70 мг, цинеолу (евкаліптолу) 1,70 мг;

допоміжні речовини: бензалконію хлорид, динатрію едетат (трилон Б), пропіленгліколь, полоксамер 407, полісорбат 20, калію дигідрофосфат, динатрію фосфат додекагідрат, вода очищена.

Лікарська форма. Спрей назальний.

Прозора безбарвна рідина з специфічним запахом; при натискуванні на клапан препарат розпилюється у вигляді аерозольного струменя.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ «Стома».

Україна, 61105, м. Харків, вул. Ньютона, 3.

Фармакотерапевтична група.

Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами. Оксиметазолін.

Код АТС R01A B07.

Фармакологічні властивості. Судинозвужувальний, протинабряковий засіб. Оксиметазоліну гідрохлорид стимулює α_1 -адренорецептори симпатичної нервової системи. Звужує судини в місці аплікації, завдяки чому зменшується набряк слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, полегшується носове дихання, знижується приплив крові до венозних синусів. Дія виявляється через 5 - 10 хв після впрорскування препарату в порожнину носа. Тривалість дії – до 12 годин.

Левоментол, камфора рацемічна, цинеол (евкаліптол) виявляють слабку місцеву протизапальну, протинабрякову та антисептичну дію, полегшують видалення слизу.

Пропіленгліколь, що входить до складу препарату, запобігає надмірному пересиханню слизової оболонки.

При місцевому застосуванні оксиметазолін незначною мірою зазнає системній абсорбції, тому його концентрація в плазмі крові дуже незначна. Виводиться, в основному, в незміненому вигляді нирками та через кишечник. Час напіввиведення становить 5 - 8 годин.

Показання для застосування.

Застудні захворювання, грип та гострі респіраторні захворювання, синусити (гайморит, фронтит, етмоїдит), отити (у складі комплексного лікування).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі форми артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, цукрового діабету, тяжкі порушення серцевого ритму, ниркова недостатність, значна гіпертрофія передміхурової залози, тиреотоксикоз, атрофічний риніт, закритокутова глаукома. Діти молодше 6 років.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Особливі застереження.

При впорскуванні у ніс не закидати голову і не перевертати балон. Не рекомендується користуватися тим самим балоном кільком особам, щоб уникнути поширення інфекції.

При зберіганні набрякlosti носових ходів після 3 дiб застосування препарату слід додатково проконсультуватися з лiкарем.

Застосування препарату жiнками у перiоди вагiтностi та годування груддю, слiд у випадках, коли на думку лiкаря користь вiд застосування перевищує потенцiйний ризик для плода/дитини.

Препарат не впливає на здатнiсть керування транспортними засобами та на працi зi складними механiзмами.

Спосiб застосування та дози.

Застосовують дорослим i дiтям вiком старше 6 рокiв.

Перед першим застосуванням препарату декiлька разiв натиснути на розпилювач до появи дисперсного струменя.

Безпосередньо перед застосуванням потримати балон з препаратом у долонях, щоб розчин досяг температури тiла.

Дозу препарату впорскують в кожну нiздрю шляхом натискання на розпилювач. Дорослим i дiтям старше 12 рокiв зробити по 2 впорскування, дiтям вiд 6 до 12 рокiв – по 1 впорскуванню в кожну нiздрю. Повторювати впорскування не ранiше, як через 12 год. Тривалiсть лiкування зазвичай не бiльше 3 днiв.

Передозування.

Симптоми: тахiкардiя, артерiальна гiпертензiя, збудження центральної нервової системи. *Лiкування:* симптоматична терапiя.

Побiчні ефекти.

При частому i тривалому застосуванні можливе поступове зниження ефекту, поява вiдчуття печiння та сухостi в носi. У осiб з пiдвищеною чутливiстю до адреномiметикiв можливі системні побiчні ефекти: нудота, артерiальна гiпертензiя, тахiкардiя; рiдко – пiдвищена збудливiсть, порушення сну.

Взємодiя з iншими лiкарськими засобами та iншi види взаємодiй.

При одночасному застосуванні препарату з iншими судинозвужувальними засобами (незалежно вiд способу введення) можливе взаємне посилення побiчних ефектiв. Сповiльнює всмоктування мiсцевоанестезуючих засобiв i пролонгує iхнiй ефект. Посилює дiю iнгiбiторiв моноамiноксидази на центральну нервову систему.

Термiн придатностi.

2 роки.

Умови зберiгання.

Зберiгати при температурi не вище 25 °С.

Зберiгати у недоступному для дiтей мiсцi.

Упаковка.

По 30 г у балонах аерозольних алюмiнiєвих з клапаном насосного типу, розпилювачем та захисним ковпачком; один балон у пачцi.

Категорiя вiдпуску.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Без рецепта.