

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛОДУ НАСТОЙКА
(TINCTURA CRATAEGI)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки плодів глоду (1 : 10) 25 мл, 100 мл;

допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина червонувато-коричневого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика» або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються в кардіології. Код АТС С01Е В04.

Фармакологічні властивості.

Біологічно-активні речовини, що містяться в плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хв – 1 годину.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років. Вагітність, період годування груддю.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не рекомендують приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить спирт етиловий, настойку не рекомендується застосовувати жінкам у періоди вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настоянку не рекомендується застосовувати внутрішньо дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Приймають внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настоянки, дітям старше 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, зменшення серцебиття).

Передозування.

При значному перевищенні дози можливе виникнення сонливості, брадикардія, які вимагають припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні ефекти.

Рідко спостерігаються сонливість, значне уповільнення серцевого тиску, алергічні реакції (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі 25 С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах-крапельницях, по 100 мл у флаконах скліних, банках або флаконах полімерних.

Категорія відпуску.

Без рецепта.