

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ТАБАКУМ-ПЛЮС

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Tabacum (Табакуму) 4D 25 мг, Tabacum (Табакуму) 3CH 25 мг, Tabacum (Табакуму) 200CH 25 мг, Sepia (Сепії) 200CH 25 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули. Гомеопатичний лікарський засіб.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 37/2.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

При хронічній залежності від тютюна для відвикання від паління.

Показання для застосування.

Нікотинова залежність.

Протипоказання.

Відсутні.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При одночасному застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Протягом лікування препаратом небажано вживати каву та спиртні напої.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань щодо застосування препарату в період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не рекомендується застосовувати препарат дітям.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначений для дорослих!

Протягом перших 5 днів – по 3 гранули під язик при кожній появі бажання палити, але не менше ніж 8 прийомів на день (*не припиняти прийом засобу, якщо втриматися від паління в перші дні не вдається!*). З 6-го до 12-го дня – по 3 гранули під язик за 15 - 20 хв до кожного прийому їжі та через 1 годину після нього (не менше ніж 6 прийомів на день). З 13-го до 19-го дня – по 1 гранулі за 15 - 30 хв до кожного прийому їжі (не менше ніж 3 прийоми на день). З 20-го до 26-го дня – по 1 гранулі зранку, натщесерце.

Гранули приймати під язик, до повного розсмоктування. За необхідності гранули розчинити у незначній кількості води.

Передозування.

Не призводить до негативних наслідків.

Побічні ефекти.

Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній упаковці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.