

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛЕВОМЕКОЛЬ
(Levomecolum)

Склад лікарського засобу:

Діючі речовини: 1 г мазі містить хлорамфеніколу – 7,5 мг, метилурацилу – 40 мг;
допоміжні речовини: поліетиленгліколь 400 , поліетиленгліколь 1500.

Лікарська форма. Мазь для зовнішнього застосування.

Мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору;

Назва і місцезнаходження виробника. ВАТ «Хімфармзавод “Червона зірка”».
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

Фармакотерапевтична група. Препарати, які сприяють загоюванню (рубцюванню) ран. Код АТС D03AX50**.
Комбінований препарат для місцевого застосування. Має протизапальну та протимікробну дію, активний щодо грамполозитивних та грамнегативних мікроорганізмів (стафілококів, кишкової палички). Легко проникає в тканину без ушкодження біологічних мембран, стимулює процеси регенерації. При наявності гною та некротичних мас антибактеріальна дія зберігається.

Показання для застосування.

Лікування гнійних ран (в тому числі інфікованих змішаною мікрофлорою) в першій фазі (гнійно-некротичній) ранового процесу, фурункулів, трофічних виразок, що довго не загоюються, опіків I -III ступеня.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння мазі в очі, на слизові оболонки.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Обмежень при застосуванні у вагітних та у період лактації немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не впливає.

Діти

Мазь застосовують у дітей.

Спосіб застосування та дози.

Мазь призначена для зовнішнього застосування у дорослих і дітей. Препаратом насичують стерильні марлеві серветки, якими пухко заповнюють рану. Зверху накладають звичайну пов'язку, можна з пергаментним або компресним папером. Можливе введення препарату у гнійні порожнини через катетер (дренажну трубку) за допомогою шприца. У цьому випадку мазь попередньо підігрівають до 35 - 37° С. Перев'язки проводять кожного дня до повного очищення рани від гною та некротичних мас.

Передозування.

Явищ передозування при застосуванні мазі Левомеколь не виявлено. При застосуванні згідно з наведеними рекомендаціями передозування неможливе.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції у вигляді висипів на шкірі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Даних про взаємодію препарату з іншими лікарськими засобами немає.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Туби зберігають в сухому, захищеному від світла місці, при температурі від 8 °С до 15 °С.

Туби, поміщені в пакки, зберігають в сухому місці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Упаковка. По 40 г мазі у тубі в пакці з картону.

Категорія відпуску.

Без рецепта.